

TaySachsova bolešt (makedonski)

Vrsta: Seminarski đ Broj strana: 13 đ Nivo: Filozofski fakultet

niverzitet Sv. „Kiril i Metodij“-Skopje Filozofski fakultet Institut za Defektologija

Predmet: Humana genetika 2

Seminarska rabota

Tema: TaySachsoba bolešt

Skopje, Dekemvri, 2005 god.

Izrabotila: Irena Vučić

Sodrđina

I.

Voved.....2

II. Istorija na TaySachs-ova bolešt.....3 III. Što e TaySachsova

bolešt.....4 .. IV. Kako se nasleduva?.....5 V. Klinički

pojavi.....7

VI. Dali može da se dijagnostიცira ova bolešt?.....9 VII. Sinonimi za TaySachsovata

bolešt.....10 . VIII. Zaklučok.....11 Koristena

literatura.....11

1

I.

Voved

So cel podobro da se zapoznaeme so temata za TaySachs-ovata bolešt će navedeme nekolku povađni karakteristiki za ova bolešt,odnosno: - što taa označuva, kolku često se javuva i vo koja populacija, kako taa se prenesuva, kako se manifestira bolesta, nejzin tretman i prevencija. No kako za voved može da se istakne slednoto:

„TaySachs-ovata bolešt spađa vo grupata na sfingolipidozi i e najpoznata sfingolipidoza.

Kaj sfingolipidozite postoji nevozmođnost za degradacija na sfingolipidite, što doveduva do progresivno talođewe na lipidite ili glikolipidite primarno vo mozokot, hepar, slezinkata. Postoi i narušovawe na CNS , so mentalno propađawe, so česti napadi i obično ova bolešt završuva letalno vo 2-3 godina od životot.

TaySach ovata bolešt e familijarno narušovawe(se javuva kaj baraem 1 člen vo familija kaj Aškenezi Evrei počesto) i rezultatira so smrt. “ (1)

2

II. Istorija na TaySachs-ova bolešt

„ Otkritieto vo 1969 god, što bilo za biohemiskite promeni dokađalo deka vo TaySachsovata bolešt, ima komplikacii vo ßheksozaminidaza za vreme na lizozomalnata hidrolizna aktivnost. Počnuvajći od 1970 god. mnogu programi i ispituvawa povrzani so TaySachsovata bolešt se aktivni, i stanala često upotrebuwana praktika.

Ø

Koj ja otkril ova bolešt?

Warren Tay 1893-1927

Vo 1881 godina Britanski oftalmolog Warren Tay gi opišal oćnite promeni kaj TaySachsovata bolešt, i ja opišal damkata koja se javuva vo retinata na okoto i koja e violetovo-crvena i koja potočno se javuva vo makulata na okoto.

Bernard Sachs 1853-1944

Bernard Sachs-neurolog vo 1887 godina gi otkril kletočnite i genetskite promeni kaj bolesta. Toj ja prepoznal familijarnata osnova na narušovaweto

TaySachs-ovata bolešt bila imenuwana spored Warren Tay i Bermard Sachs “ (6)

3

III.Što e TaySachs-ova bolešt? v Definicija :

Ø „Klasičnata forma na TaySachs-ova bolest e smrtonosno genetsko narušuvawe kaj decata koe predizvikuva progresivna destrukcija na centralniot nerven sistem CNS.“ (5) Ø „TaySachs-ova bolest e vrodna greška vo metabolizmot na sfingolipidozite.“ (6) Ø „Progresivno letalno narušuvawe na CNS“ (4)
v Etiologija i patogeneza :

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com